

**Carta dell'uso del suolo e delle fisionomie vegetazionali del territorio comunale**

- 1 - SUPERFICI ARTIFICIALI**
- 1.1 - Zone urbanizzate di tipo residenziale
  - 1.1.1 - Zone residenziali a tessuto continuo
  - 1.1.2 - Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado
  - 1.2 - Insediamenti produttivi, dei servizi generali pubblici e privati, delle reti e delle aree infrastrutturali \*
  - 1.3 - Aree estrattive, cantieri, discariche e terreni artefatti e abbandonati \*
  - 1.4 - Zone verdi artificiali non agricole
- 2 - SUPERFICI AGRICOLE UTILIZZATE**
- 2.1 - Seminativi avvicendati e prati stabili
  - 2.1.1 - Seminativi in aree non irrigue e prati stabili (comprendono anche vivai, colture orticole in pieno campo, in serra e sotto plastica in aree non irrigue)
  - 2.1.2 - Seminativi in aree irrigue (comprendono anche vivai, colture orticole in pieno campo, in serra e sotto plastica in aree irrigue)
  - 2.2 - Colture permanenti
  - 2.2.1 - Vigneti
  - 2.2.2 - Frutteti e prati minori
  - 2.2.3 - Oliveti
  - 2.2.4 - Altre colture arboree (pioppi, nocci, arboricoltura da legno, conifere a rapido accrescimento, etc.)
  - 2.3 - Zone agricole eterogenee
  - 2.3.1 - Sistemi culturali e partecellari complessi e colture temporanee associate a colture permanenti
  - 2.3.2 - Aree prevalentemente occupate da colture agrarie con presenza di spazi naturali importanti
- 3 - TERRITORI BOSCATI E AMBIENTI SEMI-NATURALI**
- 3.1 - Boschi
  - 3.1.1 - Boschi di latifoglie
  - 3.1.1.1 - Boschi a prevalenza di latifoglie sempreverdi
  - 3.1.1.1.1 - Boschi a prevalenza di leccio (*Quercus ilex*), talvolta con alloro (*Laurus nobilis*)
  - 3.1.1.1.2 - Boschi a prevalenza di sughera (*Quercus suber*)
  - 3.1.1.2 - Boschi a prevalenza di latifoglie decidue
  - 3.1.1.2.1 - Querceti misti a locale dominanza di cerro (*Quercus cerris*), farnetto (*Q. frainetto*), roverella (*Q. pubescens* s.l.)
  - 3.1.1.2.2 - Boschi misti a locale dominanza di carpino bianco (*Carpinus betulus*), castagno (*Castanea sativa*), carpino nero (*Ostrya carpinifolia*), olmo (*Ulmus minor*)
  - 3.1.1.2.3 - Boschi ripariali ad alto fusto a dominanza di pioppi (*Populus* sp.), salici (*Salix* sp.) e/o altre specie igrofile
  - 3.1.1.3 - Boschi di latifoglie non native a dominanza di robinia (*Robinia pseudoacacia*) e/o ailanto (*Ailanthus altissima*)
  - 3.1.2 - Rimboschimenti a prevalenza di conifere
  - 3.1.3 - Rimboschimenti misti di conifere e latifoglie
  - 3.1.4 - Rimboschimenti a prevalenza di latifoglie
  - 3.2 - Vegetazione arbustiva e/o erbacea
  - 3.2.1 - Pascoli naturali e praterie
  - 3.2.2 - Cespuglieti a locale prevalenza di ginestra (*Spartium junceum*), pruno selvatico (*Prunus spinosa*), rovo (*Rubus ulmifolius*), olmo (*Ulmus minor*), canna (*Arundo donax*)
  - 3.2.3 - Canneti (*Phragmites australis* e/o *Arundo donax*)
  - 3.2.4 - Cespuglieti a prevalenza di specie sclerofille sempreverdi
  - 3.2.4.1 - Macchia alta a locale prevalenza di fillirea (*Phillyrea latifolia*, *P. angustifolia*), circa (*Erica arborea*), corbezzolo (*Arbutus unedo*) e leccio (*Quercus ilex*)
  - 3.2.4.2 - Macchia bassa e garighe con mirto (*Myrtus communis*), lentisco (*Pistacia lentiscus*), e cisti (*Cistus* sp.)
  - 3.2.4.3 - Ginepri duri (*Juniperus oxycedrus* ssp. *macrocarpa* e/o *Juniperus phoenicea*)
  - 3.3 - Zone aperte con vegetazione rada o assente
  - 3.3.1 - Spiagge, dune, sabbie
- 4 - ZONE UMIDE**
- 4.1 - Zone umide interne
- 5 - CORPI IDRICI**
- 5.1 - Acque continentali
- 6 - AREE CENSURATE**
- Classi di copertura per le sottoclassi 31:
- a < 40%
  - b 40% - 70%
  - c > 70%
- \* Le sottoclassi 1.2 e 1.3 non sono state cartografate quando risultano intercluse nella sottoclasse 1.1.1.
- Confine comunale

