

Carta dell'uso del suolo e delle fisionomie vegetazionali del territorio comunale



- 1 - SUPERFICI ARTIFICIALI**
- 1.1 - Zone urbanizzate di tipo residenziale
 - 1.1.1 - Zone residenziali a tessuto continuo
 - 1.1.2 - Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado
 - 1.2 - Insediamenti produttivi, dei servizi generali pubblici e privati, delle reti e delle aree infrastrutturali*
 - 1.3 - Aree estrattive, cantieri, discariche e terreni artefatti e abbandonati*
 - 1.4 - Zone verdi artificiali non agricole

- 2 - SUPERFICI AGRICOLE UTILIZZATE**
- 2.1 - Seminati avvicendati e prati stabili
 - 2.1.1 - Seminati in aree non irrigue e prati stabili (comprendono anche viti, colture orticole in pieno campo, in serra e sotto plastica in aree non irrigue)
 - 2.1.2 - Seminati in aree irrigue (comprendono anche viti, colture orticole in pieno campo, in serra e sotto plastica in aree irrigue)
 - 2.2 - Colture permanenti
 - 2.2.1 - Vigneti
 - 2.2.2 - Frutteti e frutteti minori
 - 2.2.3 - Oliveti
 - 2.2.4 - Altre colture arboree (gioggetti, noceti, arboricoltura da legno, conifere a rapido accrescimento, etc.)
 - 2.3 - Zone agricole eterogenee
 - 2.3.1 - Sistemi culturali e partecellari complessi e colture temporanee associate a colture permanenti
 - 2.3.2 - Aree prevalentemente occupate da colture agrarie con presenza di spazi naturali importanti

- 3 - TERRITORI BOSCATI E AMBIENTI SEMI NATURALI**
- 3.1 - Boschi
 - 3.1.1 - Boschi di latifoglie
 - 3.1.1.1 - Boschi a prevalenza di latifoglie sempreverdi
 - 3.1.1.1.1 - Boschi a prevalenza di faggio (*Quercus ilex*), tiglio (*Laurus nobilis*)
 - 3.1.1.1.2 - Boschi a prevalenza di sughero (*Quercus suber*)
 - 3.1.1.2 - Boschi a prevalenza di latifoglie decidue
 - 3.1.1.2.1 - Querceti misti a locale dominanza di cerro (*Quercus cerris*), lanino (*Q. lanmeto*), roverella (*Q. pubescens* s.l.)
 - 3.1.1.2.2 - Boschi misti a locale dominanza di carpino bianco (*Carpinus betulus*), castagno (*Castanea sativa*), carpino nero (*Ostrya carpinifolia*), olmo (*Ulmus minor*)
 - 3.1.1.2.3 - Boschi ripariali ad alto fusto a dominanza di pioppo (*Populus sp.*), salici (*Salix sp.*) e/o altre specie igrofile
 - 3.1.1.3 - Boschi di latifoglie non native a dominanza di robinia (*Robinia pseudoacacia*) e/o ailanto (*Ailanthus altissima*)
 - 3.1.2 - Rimboschimenti a prevalenza di conifere
 - 3.1.3 - Rimboschimenti misti di conifere e latifoglie
 - 3.1.4 - Rimboschimenti a prevalenza di latifoglie
 - 3.2 - Vegetazione arbustiva e/o erbacea
 - 3.2.1 - Pascoli naturali e praterie
 - 3.2.2 - Cespuglieti a locale prevalenza di ginestra (*Spartium junceum*), pruno selvatico (*Prunus spinosa*), rovo (*Rubus siliquosus*), olmo (*Ulmus minor*), canna (*Arundo donax*)
 - 3.2.3 - Cannaie (*Phragmites australis* e/o *Arundo donax*)
 - 3.2.4 - Cespuglieti a prevalenza di specie sclerofille sempreverdi
 - 3.2.4.1 - Macchia alta a locale prevalenza di fillirea (*Phillyrea latifolia*, *P. angustifolia*), erica (*Erica arborea*), corbezzolo (*Arbutus unedo*) e leccio (*Quercus ilex*)
 - 3.2.4.2 - Macchia bassa e garighe con mirto (*Myrtus communis*), lentisco (*Pistacia lentiscus*), e cisti (*Cistus sp.*)
 - 3.2.4.3 - Gineproi d'umidità (*Juniperus oxycedrus* ssp. *macrocarpa* e/o *Juniperus phoenicea*)
 - 3.3 - Zone aperte con vegetazione rada o assente
 - 3.3.1 - Spiagge, dune, sabbie

- 4 - ZONE UMIDE**
- 4.1 - Zone umide interne

- 5 - CORPI IDRICI**
- 5.1 - Acque continentali

- 6 - AREE CENSURATE**
- 6.1 - Aree censurate

- Classi di copertura per le sottoclassi 3.1:
- a < 40%
 - b 40% - 70%
 - c > 70%

* Le sottoclassi 1.2 e 1.3 non sono state cartografate quando risultano intercluse nella sottoclasse 1.1.1.

----- Confine comunale

